

Floristische Bestandsaufnahme am „Schanzenhang“, oberhalb der „Weilermer Skihütte“

3. 8. und 8. 8. 2021, Bestandsaufnahme ohne Gräser, ohne Farne, einschnittige Wiese zwischen drei Waldrändern, Flurstück „Gillen“ Ausräumen des Schnittgutes, Hangneigung bis 30°, Hangexposition: Nordost, 590-610 mNN, Obere Jura, *Impressa-Mergel* (früher Weißjura α)

Arznei-Baldrian	<i>Valeriana officinalis</i>
Acker-Glockenblume	<i>Campanula rapunculoides</i>
Acker-Kratzdistel	<i>Cirsium arvense</i>
Acker-Schachtelhalm, „Zinnkraut“	<i>Equisetum arvense</i>
Blutwurz	<i>Potentilla erecta</i>
Breit-Wegerich	<i>Plantago major</i>
Dorniger Hauhechel	<i>Ononis spinosa</i>
Echtes Johanniskraut, „Tüpfel-Hartheu“	<i>Hypericum perforatum</i>
Gewöhnliche Braunelle	<i>Prunella vulgaris</i>
Gewöhnlicher Dost	<i>Origanum vulgare</i>
Gewöhnlicher Frauenmantel	<i>Alchemilla vulgaris</i>
Gewöhnlicher Hornklee	<i>Lotus corniculatus</i>
Gewöhnlicher Wirbeldost	<i>Clinopodium vulgare</i>
Große Händelwurz, „Mücken-Händelwurz“	<i>Gymnadenia conopsea</i>
Großes Hexenkraut, „Zirze“	<i>Circaea lutetiana</i>
Himbeere	<i>Rubus idaeus</i>
Kleiner Klee	<i>Trifolium dubium</i>
Kleiner Odermennig	<i>Agrimonia eupatoria</i>
Kohl-Lauch	<i>Allium oleraceum</i>

Kohl-Kratzdistel	<i>Cirsium oleraceum</i>
Rot-Klee	<i>Trifolium pratense</i>
Scharfer Hahnenfuß	<i>Ranunculus acris</i>
Spitz-Wegerich	<i>Plantago lanceolata</i>
Steifer Augentrost	<i>Euphrasia stricta</i>
Vogel-Wicke	<i>Vicia cracca</i>
Wald-Engelwurz	<i>Angelica sylvestris</i>
Wald-Greiskraut	<i>Senecio sylvaticus</i>
Wald-Witwenblume, „Knautie“	<i>Knautia dipsacifolia</i>
Wald-Ziest	<i>Stachys sylvatica</i>
Wiesen-Bocksbart	<i>Tragopogon pratensis</i>
Wiesen-Flockenblume	<i>Centaurea jacea</i>
Wiesen-Pippau	<i>Crepis biennis</i>
Wiesen-Schafgarbe	<i>Achillea millefolium</i>

(Namensgebung aus Standardliste des Bundesamtes für Naturschutz, 2017)

Aufnahme am 3. August 2021 durch Gertraud Maier und Rudi Übelhör, Weiler in den Bergen